

## FÖRFRUKTSVÄRDE

Förfruktsvärde beskrivs ibland som ”Kväve i mark och skörderester från föregående gröda som kommer efterföljande gröda tillgodo”. Det uttrycks i motsvarande mängd handelsgödselkväve. Det är emellertid inte hela sanningen, utan det är viktigt att skilja på:

### Skördepåverkan:

- Sanering av sjukdomar
- Förbättrad struktur
- Säkrare etablering

### Kväveefterverkan:

- Det extra kväve som är kvar i marken efter en kväverik förfrukt.

När man gör en gödslingsplan tar man hänsyn till

**skördepåverkan** - genom att anpassa den förväntade skörden efter förfrukt och  
**kväveefterverkan** – genom att korrigera kvävegivan efter förfrukt.

Jordbruksverket kräver i sina föreskrifter\* att lantbrukare inom känsliga områden ska göra en växtodlingsplan eller motsvarande. I växtodlingsplanen ska gödslingsbehovet till varje enskild gröda beräknas och utgå från förväntad skörd. Den förväntade skörden bestäms utifrån fältets avkastningspotential och förfrukten (skördepåverkan).

Efter att ha bestämt det totala kvävebehovet korrigerar man sedan för stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Kvävebehovet korrigeras då utifrån förfruktens kväveefterverkan.

Nedanstående siffror är hämtade ur Riktlinjer för gödsling och kalkning 2015.  
 Tabell Olika gröders förfruktsverkan uttryckta som skördepåverkan kg/ha, och som Kväveefterverkan, kg N/ha.

Förfrukt	Skördepåverkan i efterföljande gröda, kg/ha		Kväveefterverkan i efterföljande gröda, kg N/ha	
	Höstsäd	Vårsäd	Höstsäd	Vårsäd
Höstsäd, korn	0	0	0	0
Havre	700	0	0	0
Höstraps	1200		40	
Våroljeväxter	800	500	20	20
Foderärter	1000	500	35	25
Åkerbönor	700	700	25	25
Potatis	800	800	10	10
Socketbetor	500	800	25	20
Blandvall	800	500	40	40
Gräsvall	400	200	15	15

\* Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.



greppa näringen

Grödtyp	Kväveefferverkan Kg N/ha	
	Höstplöjning	Vårplöjning
<b>Fånggröda eller mellangröda insådd i vår- eller höstsåd</b>		
Rajgräs	0	0
Rödklöver	25	35
Vitklöver	30	35
Rödklöver + rajgräs i blandning	15	10
<b>Gröngödslingsvall</b>	<b>Tidig höstplöjning och höstsådd</b>	<b>Sen höst- eller vårplöjning och vårsådd</b>
Rödklöver, alsikeklöver	60	70
Rödklöver + gräs	40	50
Vitklöver	70	80
Vitklöver + gräs	50	60
Rajgräs	0	0



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden