



Bli en bättere betesrådgivare

Ekorådgivning på Jordbruksverket 24/6 - 2025

v/ Hans Lund ØkologiRådgivning Danmark

Innehåll

- Økonomisk betydning af afgræsning
- God planlægning
- Hvor langt kan køerne gå – drivveje.
- Opfølgning
- Rug/rajgræs til afgræsning
- Hvad er succeskriterier for Afgræsning
- Klima
- Hvad gør man i udlandet
- Motivation

Forventet resultat ved forskellige udbytter i afgræsningsmarken
180 køer – 180 Ha (Dkr.)

Udbytte kg ts/Ha	5 Kg ts græs	8 kg ts græs
5200	- 34.900	+ 5.100
5700	3.608.561	+ 50.100
6200	+ 29.300	+ 87.800
6700	+ 54.200	119.900

Planlægning – hvad indeholder en god plan?


- Vurder marken – alder og udbyttepotentiale
- Ambitionsniveau med hensyn til græsoptagelse
- Arrondering
- Vanding
- Afgræsningssystem
- Slætstrategi på afgræsningsmarker

Afgræsningssystemer

Reguleret storfold

Stribegræsning

Skiftefolde



Reguleret storfold




Reguleret storfold

Fordele

- Enkelt system
- Kræver ikke meget hegn

Udfordringer

- Udbytte
- Styring
- Følsom




Stribegræsning



Stribegræsning



Stribegræsning




Stribegræsning – Nyt græs hver gang

Fordele

- Ensartet græskvalitet
- Udbytte
- Motivation hos køerne
- Længere græs
- Større roddybde
- Mindre tørkefølsomt

Udfordringer

- Bagtråd (sikrer genvækst)
- Drivveje



Skiftefolde



Skiftefolde



Skiftefolde



Skiftefolde

Dag 6

Dag 5

Opdeling
mark

Dag 4

Drivvej

Drivvej

Drivvej

Kører ud
og ind

3.4
Kl.græs as øko
5.40 ha

1-0
Kl. græs og øko
15,72 ha

3-0
Kl. græs og øko
6,24 ha

3-1
Kl.græs og øk
3.87 ha

3-2
Kl. es as oko
52 ha

3-3
KI græs og øko
7,29 ha

1-1
Helsæd, várbyglært ok
7,42 ha

Planlægning af afgræsningen 2025


Hos: Lille Tanghusgaard / Gendan forventet udbytte

Græsblanding	C: Øko. Kløvergræs 1-3. års JB 1-7 med vand							Gendan standardtal
Forventet udbytte kg ts/Ha	6000							
Antal køer	130	130	130	130	130	130	130	
Kg ts/Ha/dag	15	50	43	37	25	21	9	
Kg. ts. græs/ko/dag*	3,9	4,0	5,5	6,5	5,0	5,5	2,4	
Arealkrav Ha. Græs:	34,5	10,3	16,6	22,8	25,8	34,5	34,5	
Ha til rådighed:	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
Min. Areal ift. Anbefalinger	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Fold størrelse, HA	2,5	0,7	1,2	1,6	1,8	2,5	2,5	
Hviletid, dage	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Dage pr. fold	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Antal folde	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	


Gns. græsoptagelse /ko/dag 4,8 Kg. ts. (Fra 1/5 til 31/10)

Udbytte 2024 = 7401 kg ts/ha
Græsoptagelse = 301 kg ts/ko
Start afgræsning på de 4 ha, der skal med, på mark 7. Herefter mark 6-0 og 6-1. Tag slæt på resten af mark 7. Når rugen er klar til afgræsning, sættes hele mark 7 af til slæt, og mark 6-0 og 6-1, afgræsses sammen med rugen. Rugen skal helst afgræsses hver 5 dag. Del den derfor op i 5 marker. Når mark 7 er klar til afgræsning, tages mark 6-0 og 6-1 fra til slæt. herefter afgræsses alle marker.
Del kalvefolde op i fire folde, og skift hver uge. Så får marken 3 ugers hvile og parasitter bliver et mindre problem.

Forventede græsudbytter




Græsoptagelse over sæsonen



Afgræsningens grundlov!

(StorfolDSAfgræsning)

Kg organisk stof/ha/dag



ØkologiRådgivning Danmark

Åbyhøj – Billund – Esbjerg – Herning – Holstebro

Tel.: 76 60 23 34

info@oerd.dk

www.oerd.dk

Passion • Innovation • Nærvær





Hvad har vi i værktøjskassen?

- Støvler
- Øjne
- Afgræsningsprognose
- Græsmåleren
- Droner
- Sattellitter


Støvler



Afgræsningsprognose



Afgræsningsprognose



Afgræsningsprognose

Ændring fra sidste uges gennemsnit til næste uges gennemsnit	
Text	Value
FEN pr. ha pr. uge (%)	-10
NEL20 (MJ/kg TS)	-0,07
Protein (g/kg TS)	+3,4
Sukker(g/kg TS)	+0,5

Billund (7190) ▼ 2025 ▼ 2 uger ▼


FEN Årsniveau 5500 ▼

Græsmåleren

- 30 målinger/mark
- Beregner selv gennemsnit



Afgræsningsrækkefølge ud fra græsmåling




Farmote

- Oprindeligt hollandsk – nu ejet af Galagher, NZ
- Sentinel 2 data kombineret med pæle med sensorer (kamera, klima og jord) i marken til kalibrering af satellitdata
- (Krav om et vist antal sensorpæle i et land for præcise estimater)
- Vækstprognose
- Brugerinput (gødskning, vanding, græsning/slæt)
- <https://vimeo.com/254382799>



Ruumi.io

- Udviklet I Tyskland/Danmark (DTU)
- Kombinerer Sentinel 1 & 2, AI og plademåler og brugerkorrektion
- Egentlig fokuseret på sporbarhed, jordsundhed og klimaaftryk for aftagerleddet
 - Kunder som Lidl – bruges på 1800 bedrifter
- Gratis app



Hvad tilbyder du dine køer ved afgræsning?

40% kløver (DMS)	8 cm	12-15 cm	20-25 cm
FK org. Stof	79	79	77
Protein %	24	23	21
AAT/kg ts	94	94	92
PBV/kg ts	86	77	62
NDF	360	360	400
Sukker	110	120	120
NEL/kg ts	6,53	6,49	6,30
Kg ts/FEN	1,03	1,04	1,09

Hvad er det lige du gør med ensilagen?



Ny mark hver dag

Concentration of nutrients (dry matter basis) in orchardgrass harvested in October from the Northeast U.S. (data from Karen Hoffman, eOrganic eXtension Webinar 9/16/2010).			
Total plant height was 9 inches	Crude Protein (%)	NDF (%)	NEL (Mcal/lb)
Top one-third	27.4	38.5	0.79
Middle one-third	22.9	44.6	0.76
Bottom one-third	14.0	60.0	0.67

Hvorfor giver det mening med foldafgræsning?

- Udbytte
- Styring
- Mindre tørkefølsom
- Større roddybde
- Græs der passer bedre til vommen (vomvenlig græs)



Foldafgræsning – hvorfor?

Eliteafgræsning 2022*	Foldafgræsning	Storfoldsafgræsning
2021 + 26 %	12 dage eller flere mellem afgræsninger	Mindre end 12 dage mellem afgræsninger
Bedrifter	23	12
Kg ts/ha	6050 (+15,6 %)	5236
Græsoptagelse kg TS/ko	1091	1027
Antal køer	216	237
Ydelsesniveau april 2022	9756	9640
Afgræsning ha/ko	0,29	0,30
Ydelse i forhold til forventet	98,1	91,0

*Opfølgning og rådgivning ved afgræsning.

Foder i stalden

- Skal synkroniseres i forhold til græstilbud
- Dør lukket til stalden når der afgræsses
 - Nogle foretrækker staldfoder
 - Andre foretrækker afgræsning



AMS

- Tom foderbord når der afgræsses

Hvad kan du gøre?


- Drivvejen
- Natafgræsning (den varme periode)
- Siestaafgræsning
(Synkronisering af næringsstoffer)



Siestaafgræsning

- Afgræsning 4 timer morgen og 4 timer aften
- 1 til 2 kg ekstra mælk

Kvægs naturlige afgræsningsrytme




De tre vigtigste ting i styring af afgræsning

- Opsyn med græsmarken flere gange ugentligt
(Så har du mulighed for at reagere i god tid)
- Få græsset i bund fra start (4-5 cm).
(Giver en god tæt græsmark senere)
- Planlæg efter ét slæt på alle afgræsningsmarker (Stubhøjde 5 cm)
(Mindst 3 ugers hvile inden slæt – gerne 4 uger)
hvis ikke der tages slæt, risikerer du at du kun har en ”skidefold” fra august og fremad


Hollandsk forsøg om afgræsning og metan

1. Hvad er metan emission ved ensilage, afgræsning og frisk græs på stald ?
2. Hvad er effekt af vækststadie af græs på metan emission ved afgræsning ?
3. Hvad er effekt af sæson på metan emission ved afgræsning

GreenFeed måler metan kvantitativt




35% reduktion i metan ved afgræsning i Hollandsk forsøg i april/maj 2020



3 groups of 15 dairy cows


- 100% grazing (WEI)
- 100% summerfeeding (ZSV)
- 100% grass silage (GK)



Klootwijk et al., 2022; in press


- 5,5 kg concentrates
- 4 weeks with 2 weeks habituation
- Spring (A1), summer (A2) & autumn (A3)

Kun forskel i april/maj 2021



3 groups of 15 dairy cows


- 100% grazing (WEI)
- 100% summerfeeding (ZSV)
- 100% grass silage (GK)



Klootwijk et al., 2022; in press

- 5,5 kg concentrates
- 4 weeks with 2 weeks habituation
- Spring (A1), summer (A2) & autumn (A3)

Metan udledning i forhold til græslængde 2020




2 groups of 16 cows

- Pre-grazing height of 8 cm
- Pre-grazing height of 15 cm

Klootwijk et al., 2022; in press

Ingen forskel i 2021....



2 groups of 16 cows

- Pre-grazing height of 8 cm
- Pre-grazing height of 15 cm


Klootwijk et al., 2022; in press

Lavere koncentration af metan ved afgræsning målt med ‘Sniffer’

Trait	Least squares means (SE)			
	Robot 1	Robot 2	Indoor	Grazing
CH ₄ , ppm	187.7 (53.9)	216.9 (53.9)	226.0 (53.9)	178.6 (54.1)***
CO ₂ , ppm	4,190.8 (257.9)	4,262.7 (257.7)	4,162.4 (257.7)	4,291.2 (258.7)***
CH ₄ :CO ₂	0.044 (0.007)	0.049 (0.007)	0.050 (0.007)	0.042 (0.007)***

*** $P < 0.001$.

Szalanski et al. (2019)



Godt for klima: mindre metan ved afgræsning

Køer på stald

Giver ammoniak fordampning fra stald og lager

Giver metan fordampning fra stald og specielt lager

Køer på græs

Giver metan emission

Giver mindre ammoniak fordampning

Giver mere N til afgrøden


Hvad gør man i andre dele af verden? (Anbefalinger)

Foldafræsser

- Sikre høj produktion i marken
- Køerne kan nemmere optage større mængde græs ved større udbud
- Høj græsoptagelse
- Skånsom for marken
- Bedre genvækst
- Maks. 1 døgn/mark
- Afpuds efter afgræsning – hvis ikke græsset i bund

Stribegræsning


- Ikke uden bagtråd (sikrer genvækst)
- Max afgræsse 1 døgn i samme fold
- Jo oftere græsset betrædes, jo ringere genvækst




Irland - Statements fra Dr. Michael Egan

Rajgræs vil have 3 levende blade


- Når der dannes efterfølgende blade – dør det ældste
- Tiden mellem at der kommer nyt blad afhænger af temperatur og fugtighed




Number of days for leaf to appear



Leaf stage




Leaf stage and yield



Weekly grass measurement

- Provides valuable information on how much grass is available for grazing
- Identifies surpluses and deficits
- Methods
 - Plate meter – height




Main grazing season management

- April to mid-August
- Target pre-grazing herbage mass 1400 – 1600 kg DM/ha
- Post grazing sward height 4 cm
- Approx. 21 day rotation
- Walk farm weekly to monitor paddocks




Paddock system

5+ day paddocks




- Re-growths affected
- Reduced grass growth
- Reduced animal performance

3-4 day paddocks



- Moderate animal performance
- Average pasture utilisation

1- 1.5 day paddocks



- Increased grass growth
- Increased grass utilisation
- Increased animal performance

Forårssået vinterrug/rajgræs til afgræsning



Etablering

- Sådybde: 2 – 3 cm
- 90 – 100 kg rug/ha (200 planter/m²)
+ rajgræs
- Så i marts/april når jorden er tjenlig

Forårssået vinterrug/rajgræs til afgræsning




Afgræsning

- Afgræs første gang når rugen er 10 – 15 cm høj
- Afgræs kortvarigt og lad marken hvile
- Herefter afgræsses med max 5 dages mellemrum
- Svampeangreb viser sig, når rugen bliver for lang
- Ædelysten er mindre ved svampeangreb
- Afpuds efter behov, da rugen ikke må gå i skridning

Hvad betyder
areal pr. ko?



Areal pr. ko er ikke afgørende for udbyttet i marken




Areal pr. ko **er afgørende** for græsoptagelsen

HA/ko og græsoptagelse, 2021

$$y = 0,0002x + 0,1529$$


$$R^2 = 0,3429$$




Hvad betyder
hviledage?




Sammenhæng mellem græsoptagelse og hviledage



Sammenhæng mellem udbytte og hviledage




Sammenhæng mellem udbytte og hviledage




Hvad betyder græsoptagelsen?



Sammenhæng mellem græsoptagelse og foderpris




Sammenhæng mellem græsoptagelse og restbeløb



Hvad betyder
ydelsesniveau?



Sammenhæng mellem årsydelsen og græsoptagelse



Konklusioner

- Foldsystem med op til 21 folde giver højt udbytte og høj græsoptagelse
- 1 ny fold hver dag (max. 36 timer/fold – Irland)
- Udbyttepotentiale i græsmarken – op til +25 % i forhold til storfold (mindre end 7 dage hvile)
- Græslængde efter afgræsning 4 – 5 cm
- Drivveje er en forudsætning for succes
- God planlægning nødvendigt
- Rug med rajgræs/kløvergræs, er godt til at bryde ”kløvertræthed”

Hvad kan vi konkludere – Eliteafgræsning 2022?

- Resultaterne viser tendens til følgende sammenhænge:
 - Areal pr. ko er afgørende for høj græsoptagelse
 - Hviledage har betydning for både græsoptagelse og udbytte i marken
 - Høj græsoptagelse giver lavere foderpris
 - Græsoptagelse på over 1.000 kg ts/ko har givet de højeste restbeløb
 - Årsydelse på over 10.000 kg EKM ingen hindring for høj græsoptagelse

Afgræsningsskole blev til Eliteafgræsning Projekt 2014

Vores mål
Øge afgræsning
Øge udbytte i græsmarken
Forbedre det økonomiske afkast i afgræsningssæsonen
Konkurrence
Motivation



Hvilken rolle har rådgiveren

Rådgiverens motivation

- Kendskab til landmanden
- Kende landmandens behov
- Afdække landmandens behov
- Hvilke muligheder er der på bedriften
- Se muligheder frem for begrænsninger



Eliteafgræsning

- Opfølgning på afgræsning
- Besøg efter aftale
- Foderkontroller - ca. 2 gange/mdr.
- Benchmark
- Afgræsset areal
- Samlet græsoptagelse
- Udbytteopgørelse

Eliteafgræsning – hvordan?

Beregning af græsoptagelse



- Foderbehov
- Minus foder i stalden
- Resterende foderbehov må være afgræsset (96% Energiudnyttelse)
- Beregnes ca. hver 14. dag.




Eliteafgræsning 2024




Navn:		Totale HA til afgræsning					79,70	Type	Okologisk	Ha/ko:		Race:	Stor	Mejeri	Naturmælk	
Kroghsminde I/S		CHR :	57874	EKM:	8278	Malkesystem	Konvention		0,46							
DATO OPG.	14-04	06-05	14-05	31-05	17-06	02-07	26-07	05-08	26-08	10-09	01-10	20-10	koer			
Antal koer	180	180	181	172	177	166	167	164	169	173	175	174	172			
Græsoptagelse kg ts/ko	7,0	14,1	14,2	13,5	11,9	12,1	11,7	10,1	7,3	5,0	5,0	4,0				
Fordøjelighed, MJ /kg ts	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4				
Græsareal til rådighed til afgræsning	72	72	72	72	72	56	56	56	45	45	45	45				
Dage mellem afgræsning	12	12	12	12	12	16	18	18	18	18	18	18	15			
Udbytte, kg ts pr. ha	18	35	36	32	29	36	35	30	27	19	19	15	-	-	-	Græs dage
Antal dage	16	4	8	17	17	21	18	10	21	15	20	30	197			
Udbytte afgr./Ha	280	421	707	1255	1752	2505	3133	3429	4005	4293	4682	5146	297332			
Årlig græsoptagelse pr. ko i kg ts:														1724		
Afgræs Timer/dag	8	16	16	16	16	16	19	16	12	12	12	8				
Kg ts/time gns.	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-
Udbinding :	14-04-24	Indbinding:			01-11-24											





Økonomi	14-04	06-05	14-05	31-05	17-06	02-07	26-07	05-08	26-08	10-09	01-10	20-10	Gennemsnit
Rationspris; kr / kg ts	1,80	1,50	1,50	1,53	1,64	1,78	1,74	1,84	1,92	1,95	1,91	2,17	1,77
Mælkepris kr/kg EKM	3,72	3,80	3,81	3,90	4,01	4,06	4,04	4,16	4,16	4,16	4,25	4,29	4,03
Restbeløb; kr pr. ko	69,32	74,55	77,80	76,26	74,28	73,36	65,78	65,88	61,52	66,36	76,48	69,77	70,95



BENCHMARK

ELITEAFGRÆSNING 2025



ØkologiRådgivning
Danmark ApS

I samarbejde med:

FJORDLAND.

Dato: 06-06-2025

Ha/ko til afgræsning:	>0,1	<1
Antal køer:	>150	<500
Græsoptagelse:	>0	<50
Årsydelse/ko:	>9500	<12000
Race:	Stor	
Malkesystem:	Alle	
Dage mellem afgræsning:	>0	<30

	Egen besætning	Sammenligningsgruppens resultater			Alle besætninger, gennemsnit		
	20953	6 Besætninger	Min	Max	36 Besætninger	Min	Max
Seneste foderkontrol							
Græsoptagelse, kg TS	6,5	7,2	5,9	10,3	8,1	3,0	16,0
Udbytte, kg TS/ha/dag	32,4	46,3	32,4	72,8	47,7	21,9	90,0
Dage mellem afgræsning	14	12	8	14	12	2	25
Kraftfoder, kg TS	7,3	7,5	6,8	9,1	6,7	2,4	9,4
EKM/malkende ko	31,4	33,3	30,8	35,6	30,7	19,4	38,2
Ydelse i forhold til forventet	96,4	102,0	96,3	111,1	104,3	93,0	122,3
Fedt pct.	4,28	4,27	4,10	4,41	4,75	4,01	5,90
Protein pct.	3,54	3,57	3,43	3,79	3,82	3,37	4,39
Celletal	211.000	213.500	189.000	249.000	195.655	100.000	344.000
Foderpris, kr/kg TS	1,88	1,92	1,75	2,20	1,84	0,82	2,66
Mælkepris kr/kg EKM	4,74	4,70	4,57	4,80	4,82	4,18	5,86
Restbeløb, kr/ko/dag	104,73	111,62	104,73	125,47	106,16	85,34	139,28
Året til dato							
Græsoptagelse til dato, kg TS/ko	296	265	191	368	335	191	642
Udbytte i afgræsningsmarken, kg TS/ha	970	1.126	645	1.625	1.316	559	2.759
Antal køer (gns. sæsonen)	256	301	192	485	202	48	542
Ha/ko (forventet)	0,31	0,25	0,16	0,31	0,28	0,10	0,84
Ha/ko, opnået	0,30	0,25	0,16	0,31	0,30	0,09	0,88
Dage på græs	48	38	21	51	40	21	58
Dage mellem afgræsning	12	11	8	14	11	1	24
EKM årsydelse ydelseskontrol (april 2025)	10.499	10.381	9.855	10.955	9.391	5.981	11.587

Grill'n Grass: Den 26/6 hos Jan Bolding, Varde. Den 1/7, hos Gert Lassen, Silkeborg. Begge dag kl. 18:00 til ca. 21:30. Se invitationer i Græsmail

Analysér

Dato for græsprøven	05-maj	12-maj	19-maj	23-maj	02-jun	10-jun	17-jun
Lokation	Sevel	Ovtrup	Vildbjerg	Vandel	Daugbjerg	Nørager	Ribe
Klippet klokken	6.15	7.00	10.00	10.00	6.30	13.00	10.00
Græsblanding	22	22	21	22	Rug	Rug	22
Tørstofpct.	18,7	20,2	19,2	21,8	13,7	14,8	23,6
Aske, g/kg TS	75	80	68	73	94	69	62
Protein, g/kg TS	210	177	121	166	256	144	123
NDF, g/kg TS	343	349	358	348	354	389	402
Sukker, g/kg TS	208	211	259	245	95	218	203
OS, fordøjelighed, pct.	85,8	85,8	84,2	84,5	85,2	81,5	77,3
AAT20, g/kg TS	100	100,8	93,8	97	102,8	93,4	90
PBV20, g/kg TS	48,4	17,3	-26,7	12,3	88,4	-2	-15
NEL20, g/kg TS	7,10	6,94	6,59	6,84	7,10	6,56	6,07
Kg TS pr. FEN	1,05	1,07	1,13	1,09	1,05	1,13	1,22
Kg foder pr. FEN	5,60	5,30	5,89	4,99	7,62	7,64	5,19

Forskellige kategorier

Højeste græsoptagelse af alle

Højeste udbytte i afgræsningsmarken af alle

Bedste bedrifter i kategorierne:

- AMS
- < 300 køer (uden AMS)
- > 300 køer (uden AMS)
- Jersey

Ligelig vægtning af : Græsoptagelse pr. Ko
Udbytte i marken
Ydelse i forhold til forventet
Restbeløb pr ko/dag I gns.

AMS besætninger.	Vinder er:
Græsoptagelse, kg ts/ko	1.075
Årsydelse, kg EKM/årsko	10.850
Opnået ydelse i forhold til forventet	99
Udbytte i afgræsningsmarken, FEN/ha	6.702
Ha/ko opnået	0,43
Restbeløb, kr. pr. ko/dag (gns)	98,32

Henrik Jensen

Nr. 2: Thomas Hjort

Nr. 3. Lars Jørgensen

Frontløbere

Landmand satsede mere på afgræsning - og vandt

Brian Fruergaard-Roed har øget køernes græsoptagelse og sparet tilskudsfoder ved at satse mere på afgræsningen i år.

Skrevet af [Peter W. Mogensen](#) | 

7. nov | 11:00 |



Brian Fruergaard-Roed (i midten) har satset mere på afgræsning i år og fået gevinst for indsatsen. Han er flankeret



Chefdyrlæge: - Dansk kvægbrug er jo allerede forrest!

Betalt indhold af [LVK](#)

Seneste fra konsulenterne

Frontløbere AMS

Landmænd hædres for afgræsning: Det har været en vanskelig sæson

Perioder med tørke har gjort det mere besværligt at opnå gode resultater med afgræsning i år. Trods de svære odds har nogle landmænd hentet betydelige udbytter ude.

3. nov | 13:29 |

Skrevet af [Peter W. Mogensen](#) | [🔗](#)



Henrik og Kristian Jensen er her flankeret af kvægrådgiver Erik Andersen, ØkologiRådgivning Danmark.



Chefdyrlæge: - Dansk kvægbrug er jo allerede forrest!
Betalt indhold af [LVK](#)

Seneste fra konsulenterne



Græsgrønlandsforskning
Danmarks Græs

Græsmail

FJORDLAND

Uge 25 - 20. juni 2025

Ugens nøgletal:
Ugens græsgrønlandsforskning viser, at der er en tendens til, at græsgrønlandsforskningen er blevet mere positiv i de seneste måneder, hvilket kan skyldes en række faktorer, heriblandt en forbedring af de tekniske forhold og en øget opmærksomhed på græsgrønlandsforskningen.

Ugens græsgrønlandsforskning:

Ugens græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge
Græsgrønlandsforskning	12. uge	13. uge	14. uge	15. uge	16. uge	17. uge	18. uge	19. uge	20. uge



I denne uge er der en tendens til, at græsgrønlandsforskningen er blevet mere positiv i de seneste måneder, hvilket kan skyldes en række faktorer, heriblandt en forbedring af de tekniske forhold og en øget opmærksomhed på græsgrønlandsforskningen. Der er en tendens til, at græsgrønlandsforskningen er blevet mere positiv i de seneste måneder, hvilket kan skyldes en række faktorer, heriblandt en forbedring af de tekniske forhold og en øget opmærksomhed på græsgrønlandsforskningen.



Rådgiverens råd i denne uge:

Der kan være nogle problemer i forbindelse med græsgrønlandsforskningen, og det er vigtigt at være opmærksom på disse problemer. Rådgiveren anbefaler, at man følger de råd, der er givet i denne uge, og at man tager de nødvendige forholdsregler. Rådgiveren anbefaler, at man følger de råd, der er givet i denne uge, og at man tager de nødvendige forholdsregler.

Græsgrønlandsforskning
Danmarks Græs

ØkologiRådgivning Danmark inviterer til
GRILL'N GRASS 2025



Kom med på bedriftsbesøg, hvor vi sætter fokus på køernes metan-udskillelse

Vært: Jan Bolding
Dato: Torsdag den 26. juni
Tid: Kl. 18.00 - 21.30
Adresse: Tyvevej 14, 6800 Varde

På bedriften er der en GreenFeeder (foderautomat), der måler metan i køernes udåndingsluft, samtidig med at der tildeles kraftfoder. Køerne hos Jan Bolding græsser rigtig meget, så der bruges næsten ingen ensilage. Der fodres med frisk græs og friske ærter på foderbordet. Der malkes med robotter.

For bedrifter, der er med i Eliteafgræsning, er aftenen uden beregning. Øvrige deltagere: 300 kr. pr. deltager.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Linda Sølbach Kristensen på mail lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61 senest 18. juni 2025.

Alle er
velkomne

Aftenens program

- **Velkomst og fællesspisning**
Grillpølser med tilbehør
- **Præsentation af bedriften**
v/Jan Bolding
- **Afgræsning reducerer køernes metan-udskillelse, men hvor meget? Og hvor meget svinger det mellem bedrifterne?**
Der vises aktuelle målinger fra Jan Bolding, v/Nicolaj Ingemann Nielsen, chefkonsulent, Husdyr-innovation, SEGES
- **Aftenkaffe og kage**
- **Afgræsning indtil nu - bejlesting og besvær**
Resultater, erfaringer og fif til, hvordan du kan håndtere den usædvanlige sæson - både hvad angår foderoptagelse, dyrevelfærd og økologiregler samt hvordan du kommer godt videre.
v/ØkologiRådgivning Danmark
- **Tak for i aften**

Hvordan motiveres landmanden?

Tag udgangspunkt i hans bedrift

Spørg ind til hvad der betyder mest i forhold til afgræsning

Beregne konsekvenser af øget afgræsning

Blive sammenlignet med andre – dem der gør det bedst

Konkurrence!!!!!!!!!!

Se muligheder frem for begrænsninger



Tak for opmærksomheden

Happy happy cow – happy farmer



Lille workshop

Se på muligheder i forhold til afgræsning, ud fra markkort og afgrøder.

Mark	Ha	Afgrøde
4A	3,5	Helsæd med græs
4B	2,0	Rug til afgræsning
6A	2,9	Afgræsning 2. års
92B	2,7	Afgræsning 2. års
93B	2,2	Afgræsning 1. års
92C	3,4	Afgræsning 3. års
92A	4,5	Afgræsning 1.års
93A	3,5	Rug til høst med græs

Planlægning i marts måned.

Forslag til opdeling af marker, så der kan laves foldskifte hver dag, med 14 dages rotation

